

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。


2020年10月作成



口腔内消炎薬

アズレンのどスプレーガーバ

第3類医薬品



管理コード
512074A1



QRコードから詳しい製品情報にアクセスしたり、お薬について薬剤師に相談できるアフターサポートも提供しています。
URL : <https://minacolor.com/>

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 口内にひどいいたれのある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
口	刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

のどの炎症によるのどのあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

【用法・用量】

1日数回適量を患部に噴射塗布してください。

● 用法・用量に関する注意

1. 定められた用法・用量をお守りください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. のどの塗布用にのみ使用してください。
4. ノズルをのどの患部に向けて、アーッと声を出しながら噴射してください。(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがあります。)
5. 目に入らないように注意してください。
万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。

【成分・分量】

成分	分量(100mL中)	はたらき
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 (水溶性アズレン)	0.02g	炎症を抑えます。

添加物として、クエン酸Na、グリセリン、l-メントール、エタノール、香料を含有します。

▶ 裏面も必ずお読みください

【使用方法】



● 保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるものがあります。)
- 4.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 5.薬液がこぼれ衣類などに付着した場合には、すぐに水又は洗剤で洗ってください。
- 6.火気に近づけないでください。
- 7.本剤使用後の一定期間は、呼気中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

製品についてのお問い合わせ先

株式会社ミナカラ お客様相談窓口

☎ 03-5544-8440

受付時間: 10:00-17:00

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎ 0120-149-931

販売元:

ミナカラ薬局 (+ minacolor inc.)

〒101-0047 東京都千代田区内神田3丁目-18-3 SDビル4階
<https://minacolor.com/>

製造販売元:

ジャパンメディック株式会社

〒931-8412 富山県富山市横越168