

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | 名称 | キッズバファリンかぜシロップ P |
| 2 | 成分・分量 | 60mL 中 アセトアミノフェン 300mg、 <i>dl</i> -メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg、グアイフェネシン 80mg、ジフェンヒドラミン塩酸塩 25mg |
| 3 | 用法・用量 | 次の1回量を1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。場合により4時間の間隔をおいて、1日6回まで服用して差し支えありません。 3歳以上7歳未満 10mL、1歳以上3歳未満 7.5mL、6ヶ月以上1歳未満 6mL、3ヶ月以上6ヶ月未満 5mL、3ヶ月未満は服用しないこと |
| 4 | 効能・効果 | かぜの諸症状(鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、頭痛、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み、発熱、悪寒)の緩和 |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | <p>1. 次の人は服用しないでください</p> <p>(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください</p> <p>他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください</p> <p>(眠気があらわれることがあります)</p> <p>4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</p> <p>5. 服用前後は飲酒しないでください</p> <p>6. 長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師又は歯科医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・高熱、排尿困難の症状のある人 ・甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障の診断を受けた人 <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】</p> |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。