

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	小児用バファリンC II
2	成分・分量	1錠中 アセトアミノフェン 33mg
3	用法・用量	11歳以上 15歳未満 1回6錠、 7歳以上 11歳未満 1回4錠、 3歳以上 7歳未満 1回3錠、 以上の量を1日3回を限度として服用する。3歳未満は服用しないこと。 なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。
4	効能・効果	(1)悪寒・発熱時の解熱 (2)歯痛・抜歯後の疼痛・頭痛・打撲痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・ 肩こり痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1.次の人は服用しないでください (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬 3.服用時は飲酒しないでください 4.長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください ・医師又は歯科医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・本人又は家族がアレルギー体質の人 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍の診断を受けた人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。