

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	スクラート胃腸薬(錠剤)
2	成分・分量	1日服用量(9錠)中 炭酸水素ナトリウム 450mg、合成ヒドロタルサイト 600mg、 スクラルファート水和物 1500mg、アズレンスルホン酸ナトリウム 6mg、 ロートエキス3倍散 90mg(ロートエキスとして 30mg)、ジアスメン SS 60mg、 リパーゼ AP6 60 mg、L-グルタミン 400mg
3	用法・用量	成人(15才以上)1回3錠、1日3回、食間・就寝前又は食後に服用 15才未満の小児は服用しないこと ※ 食間とは、食後2~3時間経過し、胃の中に食べ物がほぼなくなっている時です。
4	効能・効果	胃痛、もたれ(胃もたれ)、胸やけ、胃酸過多、げっぷ(おくび)、胃重、胃部膨満感、 胃部不快感、胸つかえ、食べ過ぎ(過食)、 消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振(食欲減退)、 飲み過ぎ(過飲)、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、嘔気、 悪心)、嘔吐
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないでください 透析療法を受けている人 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 胃腸鎮痛鎮痙薬 3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください (母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある) 4. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・妊婦または妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・排尿困難の症状がある人 ・腎臓病、心臓病、緑内障の診断を受けた人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。