

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第三類医薬品		使用前には必ず添付文書を読んで下さい						
1	名称	クリニカ フッ素メディカルコート						
2	成分・分量	(1mL中)フッ化ナトリウム 0.5mg						
3	用法・用量	<p>次の1回量を用いて1日1回食後又は就寝前に洗口(ブクブクうがい)します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>4才以上</th> <th>4才未満</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1回量</td> <td>5～10mL</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1回量は、年齢等による口腔の大きさを考慮し、通常4～5才で5mL、6才以上で7～10mLです。 <洗口方法> 本剤1回量を口に含み、歯面に十分ゆきわたるように30秒から1分間洗口(ブクブクうがい)し、吐き出します。(上を向いたガラガラうがいをしない) <用法・用量に関連する注意> (1)飲みこまないでください(内服液ではありません。) (2)定められた用法・用量を厳守してください。 (3)小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとでご使用ください。 (4)ガラガラうがいではなく、飲みこまないように注意して、洗口(ブクブクうがい)をしてください。 (5)低年齢児や要介護の方、洗口の経験の少ない方は、水で洗口(ブクブクうがい)の練習を行い、確実に吐き出せることを確認してからご使用ください。 (6)必ず本品に付属しているプラスチック製計量キャップを使用し、1回量は一度に口に含んでください。 (7)使用後は口を水などですすがず、また30分間は飲食しないでください(有効成分が口腔内から洗い流され、効果が低減するおそれがあります。) (8)誤って飲用し、嘔吐、腹痛、下痢などの症状があらわれた場合には、牛乳(無い場合は水)をコップ1～2杯程度摂取し、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。 (嘔吐、腹痛、下痢などの消化器症状をやわらげる効果があります。なお、少量飲んだとしても、これらの症状があらわれない場合は、この処置は必要ありません。)</p>	年齢	4才以上	4才未満	1回量	5～10mL	×
年齢	4才以上	4才未満						
1回量	5～10mL	×						
4	効能・効果	ムシ菌の予防						
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>■次の人は使用しないでください。</p> <p>(1)4才未満の乳幼児。 (2)洗口(ブクブクうがい)ができない人。 (3)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>※次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p>						
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項							

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。