

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	バファリンジュニアかぜ薬a
2	成分・分量	12錠中 アセトアミノフェン 600mg、 <i>dl</i> -メチルエフェドリン塩酸塩 40mg、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 32mg、グアヤコールスルホン酸カリウム 160mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 4.8mg、無水カフェイン 50mg
3	用法・用量	11才以上 15才未満 1回 4錠、7才以上 11才未満 1回 3錠、5才以上 7才未満 1回 2錠、5才未満は服用しないこと 1日 3回、食後なるべく 30分以内に、水又はぬるま湯にて服用してください。
4	効能・効果	かぜの諸症状(鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、頭痛、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み、発熱、悪寒)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1.次の人は服用しないでください</p> <p>(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。</p> <p>2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください</p> <p>他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等 (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</p> <p>3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります。)</p> <p>4.服用前後は飲酒しないでください</p> <p>5.長期連続して服用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師又は歯科医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・授乳中の人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・高熱、排尿困難の症状のある人。 ・甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障の診断を受けた人。 <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。