

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 名称                                | フェルゼアDX20ローション   |
| 2 | 成分・分量                             | (1g中)<br>尿素:200mg、ジフェンヒドラミン:10mg、リドカイン:20mg、<br>グリチルリチン酸二カリウム:5mg、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE):5mg   |
| 3 | 用法・用量                             | 1日数回、適量を患部に塗擦してください。<br>※小児(15歳未満)にはご使用できません。  |
| 4 | 効能・効果                             | かゆみを伴う乾燥性皮膚(成人・老人の乾皮症)   |
| 5 | 保健衛生上の<br>危害を防止<br>するために<br>必要な事項 | <b>【してはいけないこと】</b><br>次の部位には使用しないでください。<br>(1)目のまわり、粘膜等<br>(2)引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ)部位<br>(3)かさぶたの様に皮膚がはがれているところ<br>(4)炎症部位(ただれ・赤く腫れているところ)<br><br><b>【相談すること】</b><br>1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。<br>(1)医師の治療を受けている人<br>(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。<br>(3)薬や化粧品等による刺激症状またはアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人<br>2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。<br>〔関係部位〕 〔症 状〕<br>皮 膚 …… 発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態<br>3. 2週間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 |
| 6 | 薬剤師または<br>登録販売者が<br>必要と判断<br>する事項 |  |

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。