

## 医薬品を正しく購入するための

## 説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	新新A2胃腸薬錠
2	成分・分量	9錠(1日量)中 アズレンスルホン酸ナトリウム 6mg、アルジオキサ 300mg、カンゾウ粗エキス 150mg、合成ヒドロタルサイト 1300mg、ケイ酸アルミニ酸マグネシウム 700mg、ロートエキス3倍散 90mg、リパーゼAP6 45mg、ビオヂアスターゼ2000 90mg、ホップ乾燥エキス 50mg、ケイヒ末 520mg
3	用法・用量	次の量を、1日3回、食間または食後に服用してください。 ・成人(15歳以上) 1回3錠 　・11～14歳 1回2錠 　・5～10歳 1回1錠 ・5歳未満の乳幼児 服用しないこと
4	効能・効果	●胃痛、胃部不快感、胸やけ、胃重、げっぷ(おくび)、胃酸过多 ●胃部・腹部膨満感、もたれ(胃もたれ)、食欲不振(食欲減退)、胸つかえ、胃弱、食べすぎ(過食)、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化不良 ●飲みすぎ(過飲)、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、むかつき、嘔気、恶心)、嘔吐
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。 透析療法を受けている人。 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 胃腸鎮痛鎮痙薬 3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください。(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。) 4. 長期連用しないでください。  ■次に該当する人はお申し出ください■ (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦または妊娠していると思われる婦人。 (3) 高齢者。 (4) 本人または家族がアレルギー体質の人。 (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (6) 次の症状のある人。 排尿困難 (7) 次の診断を受けた人。 腎臓病、心臓病、緑内障
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。