

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	コラントスローション α				
2	成分・分量	100mL 中 フェルビナク 3.0g 添加物としてエタノール、 <i>l</i> -メントール、ノナン酸バニリルアミド、グリセリン、プロピレングリコール、トリエタノールアミン、ヒドロキシプロピルセルロース、香料を含有する。				
3	用法・用量	1日2～4回、患部に塗布してください。 ＜用法・用量に関連する注意＞ 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。ラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。外用にのみ使用してください。塗布した直後に入浴すると強い刺激を感じることがありますので、少なくとも入浴の1時間前は使用しないでください。定められた用法・用量を守ってください。				
4	効能・効果	腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘等)、肩こりに伴う肩の痛み				
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)</p> <p>1. 次の人は使用しないこと 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。ぜんそくを起こしたことがある人。妊娠または妊娠していると思われる人。授乳中の人。15歳未満の小児。</p> <p>2. 次の部位には使用しないこと 目の周囲、粘膜等。湿疹、かぶれ、傷口。化膿している患部。</p> <p>相談すること</p> <p>1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。 (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談すること (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。</p> <table border="1" data-bbox="523 1597 1390 1675"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮ふ</td> <td>発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。</p>	関係部位	症 状	皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ
関係部位	症 状					
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ					
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項					

〔注意事項〕

1. 本誌の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。