

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ササスルー						
2	成分・分量	12錠(1日量)中 アロエ末 300mg、センナ末 500mg、ダイオウ末 430mg、ケイヒ末 100mg、ガジュツ末 100mg、コウボク末 70mg、シャクヤク末 240mg、センキュウ末 180mg						
3	用法・用量	成人(15歳以上)2~3日便通がないとき 3~9錠 4日以上便通がないとき 6~12錠 /小児(11歳以上15歳未満) 2~3日便通がないとき 2~6錠 4日以上便通がないとき 4~8錠 /11歳未満 服用しないでください。 上記の量を1日1回就寝前に服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。						
4	効能・効果	便秘、便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振、腹部膨満、腸内異常発酵、痔						
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 以下3点はしないでください</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の瀉下薬(下剤) 2) 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 3) 大量に服用しないでください <p>2-1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 医師の治療を受けている人。 2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 4) 次の症状のある人。 はげしい腹痛, 吐き気・嘔吐 <p>2-2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮 膚</td> <td>発疹・発赤, かゆみ</td> </tr> <tr> <td>消 化 器</td> <td>はげしい腹痛, 吐き気・嘔吐</td> </tr> </tbody> </table> <p>2-3 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p> <p>2-4 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p> <p>2-5 用法・用量に関連する注意</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 用法及び用量を厳守してください。 2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。 3) 便通などの改善が見られたら量を減らし、服用間隔をあげるようにしてください。 	関係部位	症 状	皮 膚	発疹・発赤, かゆみ	消 化 器	はげしい腹痛, 吐き気・嘔吐
関係部位	症 状							
皮 膚	発疹・発赤, かゆみ							
消 化 器	はげしい腹痛, 吐き気・嘔吐							

6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	
---	-----------------------	--

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

Updated on Mar. 2013 (revision with the change of the mention summary)

Read this instructions before use.
Keep it carefully to the last.

Class designated2 OTC drug

APERIENT

「SASA THROUGH」

< Feature >

「**SASA THROUGH**」 combined with five kinds of medicinal plants which are Aloe, Senna Leaf, Rhubarb and others. These medicinal plants promote the vermiculation of large intestine to indicate a calm laxative effect and improve gastrointestinal symptom. 「**SASA THROUGH**」 is also combined with medicinal plants to promote blood circulation for female to reduce hot flashes . Therefore you can take it as you grow older and to relieve indigestion..



Instructions

Warning

(Please follow the instruction to avoid side effects)

- 1 . While you are take this medicine; do not take the following pharmaceutical product. (Laxatives)
2. Avoid taking this medicine while nursing a baby or avoid nursing after taking this medicine.
3. Do not take this medicine in large quantities.



Recommendation

1. People below should consult with a doctor, a pharmacist or a registered vendor before taking the medicine.
 - 1) The person who is undergoing treatment by a doctor
 - 2) A pregnant woman or considered to be pregnant
 - 3) The person who has had an allergic symptom by any medicine
 - 4) The person with the following symptom.

Intense abdominal pain, nausea, vomiting

2. When symptoms appears, after remedy, possible side effects may appear
In following the cases, stop medication promptly, and consult a doctor a
pharmacist or a registered vendor with this document.

Body parts concerned	Symptoms
Skin	Rash · flare , itch
digestive organ	Intense abdominal pain , nausea · vomiting

3. When symptoms do not improve even after taking this medicine for
around one week, stop taking this medicine and consult a doctor a
pharmacist or a registered vendor.

【Effect and efficacy】

- Constipation
- Symptoms followed by constipation, Sluggishness, hot flash, dry rough skin, skin eruption, lack of appetite, abdominal distension, enteric abnormal ferment, hemorrhoids

【Directions】

	bowel movement does not appear in 2~3 days	bowel movement does not appear in more than four days
Adult (15 years old or older)	3-9 tablets	6-12 tablets
Child (younger than 15 years old 11 years old or older)	2-6 tablets	4-8 tablets
Under 11 years old	Please do not take it	

Follow the quantity mentioned above once daily, before going to bed. Start with the smallest quantity, and increase or decrease intake little by little as you observe the condition of your bowel movement.

<Attentions about usage and dosage>

- (1) Observe usage and dosage above.
- (2) Children must be given proper supervision by an adult when taking.
- (3) If improvement in bowel movements is seen, reduce quantity and increase the interval of remedy.

【Ingredient, a quantity and action】

Under 1 daily output (12 tablets)

Ingredient	Quantity	Action
Powdered Aloe	300mg	Stimulate large intestine and promote peristalsis and promote bowel movement
Powdered Senna Lerf	500mg	
Powdered Rhubarb	430mg	
Powdered Cinnamon Bark	100mg	Improve stomach and intestines function and improve appetite.
Powdered Zedoary	100mg	
Powdered Magnolia Bark	70mg	
Powdered Peony Root	240mg	Suppressing effect tohot flash and heaviness of the head due to constipation
Powdered Cnidium Rhizome	180mg	

Additives : SASA-HEALTH (The extract of *Sasa senanensis* Rehder), Partly-Pregelatinized-Starch , Powdered Cellulose , Aluminum Silicate , Anhydrous Silicic Acid, Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate, CMC-Ca, Talc, Magnesium Stearate, Hydroxypropyl-methyl-cellulose, Ethyl-Cellulose, Glycerol Esters of Fatty Acids, Titanium Oxide, Sodium Copper-Chlorophyllin.

<Attention related to Ingredient >

- (1) After taking this medicine, urine color may change from red to yellowish-brown, but do not worry. It is caused by Rhubarb and other ingredients in this medicine.
- (2) Because this medicine is a product made from medicinal plants (Chinese medicinal herb), the color of the tablet may be slightly different from one pill to another. In addition, spots may be seen in the surface of the tablet. This spots are crude drug ingredients, but not an alien substance nor

signs of degradation , so it does not affect the efficacy of the product.

【Storage and handling instruction】

- (1) Please avoid exposing to direct sunlight and store in a cool dry place.
- (2) Keep out of the children's reach.
- (3) In order to avoid misuse and to keep the quality, please do not transfer to another container..
- (4) Do not use the product after the expiration date.

【For inquiries】

- (1) The drugstore where you bought this product.
- (2) Daiwa Biological Research Institute Co., Ltd. Customer service
- (3) Kanagawa Science Park(KSP) D Bldg,8th fl. 3-2-1 Sakado ,
Takatu-ku Kawasaki, Kanagawa. 213-0012 JAPAN
Telephone ; +81-04-819-2296
Office hours ; From 9 : 00 a.m. to noon, From 1:00 p.m. to 5:00 p.m.
(except Saturday, Sunday, Holiday)

SALESAGENCY : Daiwa Biological Research Institute corp.

PRODUCTIONSALESAGENCY : **Fukuchi-PharmaceuticalCo., Ltd.**

(824 Terajiri, Hino-cho Gamou-gun, Siga. 529-1606 JAPAN)

日本第②類醫藥品

請仔細閱讀說明書並按說明或在醫師指導下使用
並請保管好說明書已備隨時查看使用

SASATHROUGH 說明書

【藥品名稱】 **SASATHROUGH**

【成份】 蘆薈 番瀉葉 大黃等五種中草藥配製而成

【性狀】 本品為薄衣片, 除去包衣後顯灰色; 味苦。

【功能主治/適應症】 治疗便秘

緩解由於便秘引起的以下症狀: 頭重量眩, 燥熱, 皮膚粗糙,
皮疹粉刺, 食欲不振, 腹脹, 腸內異常發酵, 痔瘡

【規格型號】 每瓶裝 204 片

【用法用量】 口服。 一日一次, 睡前服用。

剛開始服用時請先適用少劑量。

然後根據實際狀況逐漸增加或減少藥劑量。

	2~3 天連續便秘不通	4 天以上連續便秘不通
成人(15 歲以上)	3~9 片	6~12 片
兒童 (11 歲以上 15 歲以下)	2~6 片	4~8 片
兒童(未滿 11 歲)	禁 止 服 用	

《用法用量的注意事項》

1. 請嚴格遵守使用說明
2. 兒童必須在成人監護下使用
3. 隨著便秘症狀的改善緩解, 可逐漸減少服用量或服用次數

【主要成份含量及功能】

一日服用量(12片)中的成分含量

成分	分量 (mg)	作用
蘆薈	300	刺激大腸蠕動, 促進排便效果
番瀉葉	500	
大黃	430	
桂皮	100	提高腸胃功能, 改善食欲不振
莪術	100	
厚朴	70	
芍藥	240	改善由於便秘引起的燥熱, 頭重量眩等不適症狀
川芎	180	

輔料(賦形劑)：**SASAHEALTH**（箬竹高效提取物），可壓性澱粉，纖維素，矽酸鋁，無水矽酸，磷酸氫鈣，纖維素衍生物 CMC-Ca，滑石粉，硬脂酸鎂，羥丙基甲基纖維素，乙基纖維素，甘油脂肪酸酯，氧化鈦，葉綠素銅鈉鹽

《成份・含量的注意事項》

1. 服藥期間, 可能會出現尿液中帶有黃棕色或發紅現象, 請不必擔心, 主要是由於中藥成份中大黃引起。
2. 本藥由中草藥（例如草根樹皮）配制而成, 片劑間表面色澤可能有差異或著有斑點出現, 是由中草藥本身引起, 不影響藥劑效果。

《緩解便秘的注意事項》

1. 養成良好的每日定時一次的排便習慣(適宜晨起或早餐後排便), 建立良好的排便規律, 有便意時不要有意克制, 免得抑制便意破壞排便習慣。
2. 參加適當的文體活動或鍛煉運動, 特別是腹肌的鍛煉有利於胃腸功能的改善(如散步, 仰臥起坐, 腹部按摩等)。
3. 養成每天早晨起床後先喝一杯溫開水的習慣有助於便秘的預防和治療。
另外, 平時增加含纖維素較多的蔬菜和水果, 適當攝取粗糙而多渣的雜糧。

【使用存放注意事項】

1. 請在遮光乾燥陰涼處密封儲存。
2. 請將本品放在兒童不能接觸的地方。
3. 為保障藥品片劑的質量並以防錯誤服用請不要更換藥品外裝瓶。
4. 超過了保質期限的請不要服用。

【SASATHROUGH】

便秘是一種常見的消化系統症狀，養成良好定時排便習慣非常重要。

便秘不僅給日常的生活和工作帶來很多困擾，還容易引起食欲不振，腹部脹疼等不適症狀。此外，長期便秘還容易引發頭暈目眩，燥熱，皮膚粗糙，粉刺出痘，痔瘡等一些併發症加重。

便秘的治療應以多運動、養成規律性排便等措施為主，並輔以安全的天然通便藥物治療為宜，以增加改善便秘症狀並達到徹底治癒效果。

《特點/功能》

SASATHROUGH 是由蘆薈，番瀉葉，大黃等五種中草藥配製而成的治療便秘的藥物。可促使大腸運動，潤腸通便功能以外，還可改善胃腸不適症，促進血液迴圈，改善出汗潮熱，治療婦科病等功能功效。所以不論是老年人還是胃腸較弱女性均可放心使用。另外，由於藥片劑量較小口服量或多或少可隨意調整。

【使用注意事項】

《禁止事項》

請嚴格遵守以下規則，防止病症惡化或引起藥物副作用

1. 服用此藥期間不可同時服用其他潤腸通便瀉藥。
2. 喂乳期間不可服用或避開喂乳時間。
3. 請不要超量服用。

《諮詢事項》

1. 以下人士使用本品前請諮詢醫師或藥師，在其指導下服用。
 - ① 其他疾病治療期間者
 - ② 孕婦、年老體弱者
 - ③ 過敏體質者
 - ④ 如出現劇烈腹痛，噁心/嘔吐者
2. 若服用後，有以下症狀出現可能是產生了藥物副作用，請立即停止服用，持帶此說明書諮詢醫師或藥師。

身體部位	症狀
皮膚	出疹、發紅、發癢
消化器官	劇烈腹痛、噁心/嘔吐

3. 若服用後, 有下痢症狀持續出現或時有加重, 請停止服用, 持帶此說明書諮詢醫師或藥師。
4. 若連續服用 1 周後症狀沒有改善, 請停止服用, 持帶此說明書諮詢醫師或藥師。

【連絡方式】

(1) 所購買的藥店

(2) 大和生物研究所股份有限公司 客戶服務辦公室

郵遞區號 213-0012

聯絡位址 日本 神奈川縣川崎市高津區阪戶 3-2-1
神奈川 Science park D 棟 8 樓

聯絡電話 0081-44-819-2296

辦公時間 上午 9:00~12:00 下午 13:00~17:00 (週六, 周日, 公休日除外)

銷售廠家: 大和生物研究所股份有限公司

位址: 長野縣茅野市字原山 11400-1018

製造廠家: 福地制藥股份有限公司

位址: 滋賀縣蒲生郡日野寺尻 824

日本第②类医药品

请仔细阅读说明书并按说明或在医师指导下使用
并请保管好已备随时查看使用

SASATHROUGH 说明书

【药品名称】通用名称：**SASATHROUGH**

【成份】芦荟 番泻叶 大黄等五种中草药配制而成

【性状】本品为薄衣片，除去包衣后显灰色；味苦。

【功能主治/适应症】 治疗便秘

缓解由于便秘引起的以下症状：头重晕眩，燥热，皮肤粗糙，
皮疹粉刺，食欲不振，腹胀，肠内异常发酵，痔疮

【规格型号】每瓶装 204 片

【用法用量】口服。 一日一次，睡前服用。刚开始服用时请先适用最少剂量，
然后根据实际状况逐渐增加或减少药剂量。

	2~3 天连续便秘不通	4 天以上连续便秘不通
成人(15 岁以上)	3~9 片	6~12 片
儿童 (11 岁以上 15 岁以下)	2~6 片	4~8 片
儿童(未满 11 岁)	禁 止 服 用	

《使用注意事项》

1. 请严格遵守使用说明
2. 儿童必须在成人监护下使用。
3. 随着便秘症状的改善缓解，可逐渐减少服用量或服用次数。

【主要成份含量及功能】

一日服用量（12片）中的成分含量

成分	分量(mg)	作用
芦荟	300	刺激大肠蠕动，促进排便效果
番泻叶	500	
大黄	430	
桂皮	100	提高肠胃功能，改善食欲不振。
莪术	100	
厚朴	70	
芍药	240	改善由于便秘引起的燥热，头重晕眩等不适症状。
川芎	180	

辅料(赋形剂)：**SASAHEALTH**（箬竹高效提取物），可压性淀粉，纤维素，硅酸铝，无水硅酸，磷酸氢钙，纤维素衍生物 CMC-Ca，滑石粉，硬脂酸镁，羟丙基甲基纤维素，乙基纤维素，甘油脂肪酸酯，氧化钛，叶绿素铜钠盐。

《成份·含量的注意事项》

1. 服药期间，可能会出现尿液中带有黄棕色或发红现象，请不必担心，主要是由于中药成份中的大黄引起。
2. 本药由中草药（例如草根树皮）成分配制而成，片剂间表面色泽可能稍有差异或有微斑点出现，是中草药本身引起，都不影响药剂效果。

《缓解便秘的注意事项》

1. 养成良好的每日定时排便习惯（适宜晨起或早餐后排便），建立良好的排便规律，有便意时不要有意克制，免得抑制便意破坏排便习惯。
2. 适当参加文体锻炼活动，特别是腹肌的锻炼有利于胃肠功能的改善。
如散步，仰卧起坐，腹部按摩等。
3. 养成每天晨起后喝一杯温开水的习惯有助于便秘的预防和治疗。
另外，平时增加含纤维素较多的蔬菜和水果，适当摄取粗糙而多渣的杂粮。

【使用存放注意事项】

1. 请在遮光干燥阴凉处密封储存。
2. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
3. 为保障药品片剂的质量及避免错误服用请不要更换药品外装瓶。
4. 超过了保质期期限的请不要服用。

【SASATHROUGH】

便秘是一种常见的消化系统症状，养成良好定时排便习惯非常重要。

便秘不仅给日常的生活和工作带来很多困扰，还容易引起食欲不振，腹部胀疼等不适症状。此外，长期便秘还容易引发头重晕眩，燥热，皮肤粗糙，粉刺出痘，痔疮等一些并发症加重。

便秘的治疗应以多运动、养成规律性排便等预防措施为主，辅以安全的天然通便药物治疗为宜，以增加改善便秘症状并达到彻底治愈效果。

《特点/功能》

SASATHROUGH 是由芦荟，番泻叶，大黄等五种中草药配制而成的治疗便秘的药物。可促使大肠运动，润肠通便功能以外，还可改善胃肠不适症，促进血液循环，改善出汗潮热，治疗妇科病等功能作用。所以不论是老年人还是胃肠较弱女性均可放心使用。另外，由于药片剂量较小口服量或多或少可随意调整使用。

【使用注意事项】

《禁止事项》

请严格遵守，否则可能会使症状恶化或引起药物副作用

1. 服用此药期间不可同时服用其他润肠通便泻药。
2. 喂乳期间不可服用或避开喂乳时间。
3. 请不要超量服用。

《咨询事项》

1. 有以下症状者使用本品前请咨询医师或药师，在其指导下服用。
 - ① 疾病治疗期间者
 - ② 孕妇、年老体弱者
 - ③ 有过敏体质者
 - ④ 如出现剧烈腹痛，恶心/呕吐者
2. 若服用后，有以下症状出现可能是产生了药物副作用，请立即停止服用，持带此说明书咨询医师或药师。

身体部位	症 状
皮 肤	出疹、发红、发痒
消化器官	剧烈腹痛、恶心/呕吐

3. 若服用后，有下痢症状持续出现或时有加重，请停止服用，持带此说明书咨询医师或药师。
4. 若连续服用 1 周后症状并未有改善，请停止服用，持带此说明书咨询医师或药师。

【联系方式】

(1) 所购买的药店

(2) 大和生物研究所股份有限公司 客户服务办公室

邮政编码 213-0012

所在地址 日本 神奈川县川崎市高津区坂户 3-2-1

神奈川 Science park D 楼 8 层

电话 0081-44-819-2296

时间 上午 9:00~12:00 下午 13:00~17:00 (周六, 周日, 节假日以外)

销售厂家：大和生物研究所股份有限公司

地址：长野县茅野市字原山 11400-1018

制造销售厂家：福地制药股份有限公司

地址：滋贺县蒲生郡日野寺尻 824

사사수루 (ササルー)

2013년 3월 기재 요령 변경에 따른 개정

사용하시기 전에 이 설명서를 잘 읽으십시오.
또한, 이 설명서는 사용이 끝날 때까지 소중히 보관해 주십시오.

生薬配合

便秘薬 「ササルー」 第②類医薬品

(생약 배합)
(변비약 「사사수루」 제②류 의약품)

규칙적인 변통은 쾌적한 생활을 보내기 위하여 매우 중요합니다.

변비가 되면 불쾌할 뿐 아니라 식욕 부진, 복부 팽만감 등의 증상을 일으킵니다.

계속된 변비에 의한 머리 무거움, 상기, 피부 트러블, 치질 등 여러가지 증상을 악화시킬 수 있습니다.

불쾌한 변비의 치료에는 자연에 가까운 배변을 얻을 수 있는 온화한 작용의 완하제를 이용하는 것이 적절합니다.


< 특징 >

[사사수루]는 알로에, 센나, 대황 외 5 종류의 식물성 생약을 배합한 변비약입니다.

대장 운동을 촉진시키고 완만한 하제 효과를 나타낼 생약 외, 위장 증상을 개선할 생약이나 혈액 순환을 돕고 상기 등을 개선할 부인병 저방 생약이 배합되어 있습니다.

그러므로, 고령의 고객이나 위장이 약한 여성분들도 복용하실 수 있습니다.

또, 작은 알약으로 증상에 맞추어 복용량을 세세하게 조절할 수 있습니다.

 사용 상의 주의



해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 나빠지거나 부작용을 일으키게 됩니다)

1. 이 약제를 복용하는 동안은, 다음의 의약품을 복용하지 마십시오.
다른 사제(하제)
2. 수유 중의 분들은 본제 사용을 피하고나 복용할 경우는 수유를 피하십시오.
3. 대량으로 사용하지 마십시오.



문의 상담하십시오

1. 다음과 같은 분들은 복용 전에 의사, 약사, 또는 등록판매자에게 상담하십시오.
 - (1) 의사의 치료를 받고 있는 분
 - (2) 임신 가능성이 있는 분
 - (3) 약 등에 의한 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 분
 - (4) 다음과 같은 증상이 있는 분
심한 복통, 구역질, 구토

2. 복용 후 다음의 증상이 나타나는 경우 부작용 가능성이 있으니,
즉시 복용을 중단하고 이 문서를 갖고 의사, 약사, 또는 등록 판매자에게
상담하십시오.

관계 부위	증상
피부	발진, 발적, 가려움
소화기	심한 복통, 구역질, 구토

3. 복용 후 다음의 증상이 나타날 수가 있으므로, 이런 증상의 지속 또는
증강이 있었을 경우에는 복용을 중단하고 이 문서를 갖고 의사, 약사,
또는 등록 판매자에게 상담하십시오.

설사

4. 1 주일 정도 복용해도 증상이 좋아지지 않을 경우 복용을 중단하고 이 문서를
갖고 의사, 약사, 또는 등록 판매자에게 상담하십시오.

【효능·효과】

• 변비

• 변비에 따른 다음의 증상을 완화 :

머리 무거움, 상기, 피부 트러블, 식욕 부진,
복부 팽만, 장내 이상 발효, 치질

【용법·용량】

	2.3 일 변통이 없을 때	4 일 이상 변통이 없을 때
성인(15 세 이상)	3~9 정	6~12 정
소아(11 세 이상 15 세 미만)	2~6 정	4~8 정
11 세 미만	복용하지 마십시오	

상기의 양을 하루에 한 번 취침 전에 복용하십시오. 단, 첫회는 최소량을 사용하여 변통의 상태를 보면서 조금씩 증량 또한 감량하십시오.

<용법, 용량에 관련한 주의>

- (1) 용법, 용량을 엄수하십시오.
- (2) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시키십시오.
- (3) 변통 등 개선이 나타나면, 양을 줄이고 복용 간격을 띄우도록 하십시오.

【성분, 분량과 작용】

일일량(12 정)중

성분	분량	작용
알로에 분말가루	300mg	대장을 자극하여 연동 운동을 촉진시키고 배변을 원활히 합니다
센나 분말가루	500mg	
대황 분말가루	430mg	
계피 분말가루	100mg	위장 기능을 향진시키고 식욕 부진 등을 개선합니다
아술 분말가루	100mg	
당후박 분말가루	70mg	
작약 분말가루	240mg	변비에 의한 상기나 머리 무거움 등에 효과를 나타냅니다
천궁이 분말가루	180mg	

첨가물로서 “사사헬스(얼룩 조릿대 잎의 추출액)”, 부분 알파화 전분, 셀룰로오스, 규산 Al, 무수 규산, 인산 수소 Ca, CMC-Ca, 활석, 스테아린산 Mg, 히드로키시프로필 메틸셀룰로오스, 에틸셀룰로오스, 글리세린지방산 에스테르, 산화티타늄, 강클로로필린 Na 를 함유합니다.

<성분, 분량과 관련한 주의>

- (1) 본제 복용으로 오줌이 황갈색에서 붉은 색을 띠는데, 이것은 본제 중의 대왕 분말가루 등으로 인한 것이므로 안심하십시오.
- (2) 본제는 생약(약으로서 이용되는 초근목피)으로 만든 제품이오니, 제품마다 정제의 색깔이 다소 다른 경우가 있습니다. 또한, 알약의 표면에 반점 등 보이는 경우가 있지만 이물질이나 변색이 아니며 생약 성분이므로 효과는 변함이 없습니다.

<변비 해소를 위한 일반적인 주의>

1. 하루 한번 정해진 시간(아침 식사 후가 최적)에 화장실에 가도록 합시다. 변의를 참지 마십시오.
2. 적당한 체조·운동(산책, 복근 운동·복부 마사지 등)을 습관화합시다.
3. 아침에 일어났을 때 차가운 물을 컵 한 잔 마시는 것도 효과적입니다. 또한, 녹황색 채소 근채 등 섬유질이 많은 음식을 먹도록 유의합시다.

【보관 및 취급 상의 주의】

- (1) 직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관하십시오.
- (2) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (3) 오용하지 않고 품질을 유지하기 위하여 다른 용기에 넣지 마십시오.
- (4) 사용 기한을 넘긴 제품은 복용하지 마십시오.

【문의처】

· 구입하신 약국

· 株式会社 大和生物研究所 お客様相談室
(주식회사 다이와 생물연구소 고객 상담실)

소재지 : 〒213-0012 川崎市高津区坂戸3-2-1

かながわサイエンスパーク D棟8F

(〒213-0012 가와사키시 다카쓰구 사카도 3-2-1

가나가와 사이언스 파크 D동 8층)

전화 번호 : 044-819-2296

(접수 시간) 9:00-12:00, 13:00-17:00

(단 : 토 일요일,공휴일을 제외함)

발매원 : 株式会社 大和生物研究所
(주식회사 다이와 생물연구소)
長野県茅野市玉川字原山 11400-1018
(나가노현 치노시 다마가와 아자 하라야마 11400-1018)

제조 판매원 : 福地製薬株式会社
(후쿠치제약주식회사)
滋賀県蒲生郡日野町寺尾 824
(시가현 가모우군 히노초 데라오 824)