

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ノイパパ錠
2	成分・分量	6錠中 臭化メチルペナクチジウム30mg、塩酸パパペリン90mg、デヒドロコール酸150mgを含有する。添加物として、乳糖、セルロース、CMC-Ca、及びヒドロキシプロピルセルロースを含有する。
3	用法・用量	成人(15歳以上)は1回2錠、7歳以上15歳未満は1回1錠を1日3回服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。
4	効能・効果	胃痛、腹痛、さしこみ、胃酸過多、胸やけ
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。 他の胃腸鎮痛鎮痙剤、乗物酔い薬</p> <p>2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。 (目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)</p> <p>次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 医師の治療を受けている人</li><li>・ 妊婦又は妊娠していると思われる人</li><li>・ 高齢者</li><li>・ 本人又は家族がアレルギー体質の人</li><li>・ 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人</li><li>・ 次の症状のある人 排尿困難</li><li>・ 次の診断を受けた人 心臓病、緑内障</li></ul>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。