

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第②類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	イソピロ錠
2	成分・分量	6錠中 アセトアミノフェン900mg、アリルイソプロピルアセチル尿素180mg、無水カフェイン150mgを含有する。添加物として、乳糖、セルロース、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース及びステアリン酸Mgを含有する。
3	用法・用量	1回15歳以上は2錠、7歳以上15歳未満は1錠、5歳以上7歳未満は1/2錠を、1日3回空腹時を避けて服用して下さい。服用間隔は4時間以上あけて下さい。
4	効能・効果	1) 頭痛、歯痛、抜歯後の疼痛、咽喉痛、耳痛、関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛、肩こり痛、打撲痛、骨折痛、ねんざ痛、月経痛(生理痛)、外傷痛の緩和 2) 悪寒・発熱時の解熱
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないで下さい。 (1) 本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人 (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。 (眠気があらわれることがあります。) 4. 服用時は飲酒しないで下さい。 5. 長期連用しないでください。 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。 ・ 医師又は歯科医師の治療を受けている人 ・ 妊婦又は妊娠していると思われる人 ・ 高齢者 ・ 本人又は家族がアレルギー体質の人 ・ 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・ 次の診断を受けた人 心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

