

医薬品を正しく購入するための 説 明 文 書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	けいめい が しんさん 恵命我神散 / けいめい が しんさんえす 恵命我神散S / けいめい が しんさんえす さいりゅう 恵命我神散S〈細粒〉																							
2	成分・分量	1回量(3g)中(恵命我神散)、1包(3g)中(恵命我神散S、恵命我神散S〈細粒〉) 莪朮(ガジュツ)末 2500mg、真昆布末 100mg																							
3	用法・用量	次の量を水又は白湯で服用してください。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">年齢区分</th> <th style="text-align: center;">1回量(恵命我神散)</th> <th style="text-align: center;">1回量(恵命我神散S、 恵命我神散S〈細粒〉)</th> <th style="text-align: center;">服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">成人(15歳以上)</td> <td style="text-align: center;">3g</td> <td style="text-align: center;">1包</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;"> 1日4回食後及び就寝前に服用する。 1日5～6回服用しても差し支えないが、この場合には約4時間の間隔をおいて服用する。 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11歳以上15歳未満</td> <td style="text-align: center;">2g</td> <td style="text-align: center;">2/3包</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7歳以上11歳未満</td> <td style="text-align: center;">1.5g</td> <td style="text-align: center;">1/2包</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3歳以上7歳未満</td> <td style="text-align: center;">1g</td> <td style="text-align: center;">1/3包</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3歳未満</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">服用しないこと</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) 定められた用法・用量を厳守してください。 2) 小児に服用させる場合、保護者の指導監督のもとに服用させてください。</p>			年齢区分	1回量(恵命我神散)	1回量(恵命我神散S、 恵命我神散S〈細粒〉)	服用回数	成人(15歳以上)	3g	1包	1日4回食後及び就寝前に服用する。 1日5～6回服用しても差し支えないが、この場合には約4時間の間隔をおいて服用する。	11歳以上15歳未満	2g	2/3包	7歳以上11歳未満	1.5g	1/2包	3歳以上7歳未満	1g	1/3包	3歳未満	服用しないこと		
年齢区分	1回量(恵命我神散)	1回量(恵命我神散S、 恵命我神散S〈細粒〉)	服用回数																						
成人(15歳以上)	3g	1包	1日4回食後及び就寝前に服用する。 1日5～6回服用しても差し支えないが、この場合には約4時間の間隔をおいて服用する。																						
11歳以上15歳未満	2g	2/3包																							
7歳以上11歳未満	1.5g	1/2包																							
3歳以上7歳未満	1g	1/3包																							
3歳未満	服用しないこと																								
4	効能・効果	食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐																							
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。 ・本剤又は、本剤の成分により過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。 2. 次に該当する人はご相談ください。 1) 医師の治療を受けている人 2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 3) 次の診断を受けた人：肝臓病 4) 1か月ぐらい服用しても症状がよくなる場合																							
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																								

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

肠胃药 惠命我神散 德用

第2类医药品

惠命我神散 是使用可使胃的运作活跃、具有促进胆汁分泌及脂肪消化和修复胃黏膜作用的蓬莪术粉末、以及保护消化道黏膜功效的巨藻粉末，再添加苦味辛味和芳香的郁金及生姜粉末配制成的生药制剂。
本肠胃药尤其对胃肠虚弱、有胃胀感的症状有效。



成份及含量 15岁以上 1次用量 3g当中

蓬莪术粉末 2500mg
由姜科莪术的根茎制成的生药。味苦有清凉感。增强胃功能帮助消化。增进胃黏膜血流，改善胃黏膜病。有助胆汁分泌促进脂肪消化。

巨藻粉末 100mg
由巨藻科巨藻的藻体制成的生药。可保护胃黏膜帮助肠胃恢复功能。

添加物
含郁金粉末、生姜粉末、结晶纤维素。

功能・主治
食欲不振（食欲减退）、胃部・腹部胀满感、消化不良、胃肠虚弱、过食、过饮、烧心、胀满（胃胀）、胸闷、恶心（不适、胃不适、宿醉・醉后难受、反胃、恶心）、呕吐

征求咨询 以下情况者服用前，应向医师、药剂师或注册经销商咨询。

接受医师治疗者。
对药品等有过敏史者。
诊断为肝脏病者。
服用约1个月，症状仍无改善者，应停止服用，并持本说明书向医师、药剂师或注册经销商咨询。

经销商	株式会社 惠命堂		
药物剂型	散剂		
分类	第2类医药品		
包装方式	100gx4		
推荐价格	6000日元		
JAN CORD	4955982058012		
有効期限	3年		
用法	请按以下用量用凉水或热水送服。 附带匙子的平满一匙药是3g。		
用量	年龄区分	一次用量	服用次数
	15岁以上	3g	1日4次餐后或就寝前服用。也可1日服用5-6次，每次须间隔4小时。
	11岁以上15岁未滿	2g	
	7岁以上11岁未滿	1.5g	
	3岁以上7岁未滿	1g	
3岁未滿	不可服用		
禁用事项	对本品或本品成份有过敏史（出疹、发红、发痒、浮肿等）		

腸胃藥 惠命我神散 德用 第2類醫藥品

惠命我神散 是使用可使胃的運作活躍、具有促進膽汁分泌及脂肪消化和修復胃黏膜作用的蓬莪朮粉末、以及保護消化道黏膜功效的巨藻粉末，再添加苦味辛味和芳香的鬱金及生薑粉末配製成的生藥製劑。
本腸胃藥尤其對胃腸虛弱、有胃脹感的症狀有效。



成份及含量 15歲以上1次用量（3g）當中

蓬莪朮粉末・・・・・・2500mg
由薑科蓬莪朮的根莖製成的生藥。味苦有清涼感。增強胃功能幫助消化。增進胃黏膜血流，改善胃黏膜病。有助膽汁分泌促進脂肪消化。

巨藻粉末・・・・・・100mg
由巨藻科巨藻的藻體製成的生藥。可保護胃黏膜幫助腸胃恢復功能。

添加物
含鬱金粉末、生薑粉末、結晶纖維素。

功能・主治
食慾不振（食慾減退）、胃部・腹部脹滿感、消化不良、胃腸虛弱、過食、過飲、燒心、脹滿（胃脹）、胸悶、噁心（不適、胃不適、宿醉・醉後難受、反胃、噁心）、嘔吐

徵求諮詢 以下情況者服用前，應向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢。

接受醫師治療者。
對藥品等有過敏史者。
診斷為肝臟病者。
服用約1個月，症狀仍無改善者，應停止服用，並持本說明書向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢。

經銷商 株式會社 惠命堂

藥物劑型 散劑

分類 第2類醫藥品

包裝方式 100gx4

推薦價格 6000日元

JAN CORD 4955982058012

有効期限 3年

用法 請按以下用量用涼水或熱水送服。
附帶匙子的平滿一匙藥是3g

用量	年齡區分	一次用量	服用次數
	15歲以上	3g	1日4次，餐後或就寢前服用。也可1日服用5-6次，每次須間隔4小時。
11歲以上15歲未滿	2g		
7歲以上11歲未滿	1.5g		
3歲以上7歲未滿	1g		
	3歲未滿	不可服用	

禁用事項
以下情況者不可服用。對本品或本品成份有過敏史。（出疹、發紅、發癢、浮腫等）