

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第1類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	トノス
2	成分・分量	本品 100g中 テストステロン 1g、アミノ安息香酸エチル 10g、プロカイン塩酸塩 0.5g、ジブカイン塩酸塩 1g、ジフェンヒドラミン塩酸塩 0.5g を含有する。 添加物として白色ワセリンを含有する。
3	用法・用量	男子更年期障害には患部又は皮膚柔軟部に毎日一回、約 0.1g(小豆大)ずつよくすりこむように塗擦し、好転したら隔日又は週 2 回にする。男性性器神経衰弱症(早漏、勃起力減退等)で直接性器に塗る。 【詳しいご使用方法(推奨)】 ●早漏等射精時間の遅延化:行為 20~30 分前に 5mm を亀頭部(亀頭冠)によくすり込むように塗る。麻ひ感が生じたら石鹼などで洗い落してください。なるべく少量から使用してください。(まれに効きすぎて勃起力が低下することがあります) ●勃起力減退、精力減退などの症状の改善:1 日 1 回、5mm を陰のう部全体によくすり込むように塗る。改善が認められたら、1 日おきか週 2 回程度に塗る回数を減らしてください。
4	効能・効果	男子更年期障害、男性性器神経衰弱症(早漏、勃起力減退、性器不全、精力減退、遺精、夢精等)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください。 (1)本剤の成分に対しアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)使用前に本剤をチューブから 5mm 程度出し、内股などの皮膚のうすい所にすり込んで、翌日中に薬疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれなどの症状が現れた人 (3)アンドロゲン依存性腫瘍[例えば前立腺腫瘍、乳腫瘍(悪性)]及びその疑いのある人 (4)女性 (5)小児(15 歳未満) (6)排尿困難を伴う前立腺肥大のある人 (7)前立腺検査の結果、前立腺特異抗原(PSA)の値が 2.0ng/mL 以上の人 (医師の判断に従ってください) (8)睡眠時無呼吸症候群である人 2. 次の部位には使用しないでください。 (1)目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻孔等) (2)陰茎部先端(尿道口) (3)外傷、炎症、湿疹、ただれ、化膿などのある部位 3. 本剤を使用している間は、次の医薬品を使用しないでください。 男性ホルモンを含んだ医薬品 4. 使用者以外へ付着させないでください。 (1)使用後は石鹼とぬるま湯で手を十分に洗ってください。 (2)本剤を使用者以外の人に付着させないように注意してください。 付着した場合は直ちに洗い流してください。 (3)塗布部が他の人と接触する可能性があるときは、塗布部を石鹼とぬるま湯で十分に洗い流してください。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。