

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	エフレチンG顆粒
2	成分・分量	1包(1.1g)中に次の成分を含んでいます。 カイカ末200mg カンゾウ末100mg トウキ末240mg ダイオウ末200mg サイコ末200mg メリロートエキス30mg 添加物としてCMC-Ca、メタケイ酸アルミン酸Mg、トウモロコシデンプンを含んでいます。
3	用法・用量	1日3回、食後に次の量を水又は温湯で服用してください。 大人(15才以上)1回 1包
4	効能・効果	次の場合の症状の緩和:痔核(いぼ痔)、きれ痔、痔出血
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</p> <p>1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください (1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5)次の症状のある人。下痢</p> <p>2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください (1)服用後、次の症状があらわれた場合。 皮ふ:発疹・発赤、かゆみ 消化器:食欲不振、悪心・嘔吐、腹痛</p> <p>3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください 下痢</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。