

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	サンポーインドメタシンシップEX
2	成分・分量	膏体100g中 インドメタシン 1.0mg
3	用法・用量	プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度とし患部に貼ってください。 ・15歳未満の小児は使用しないでください。
4	効能・効果	関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、引きの痛み(テニス肘等)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、肩こりに伴う痛み
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>【してはいけないこと】 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)</p> <p>1. (1)本剤又は本剤の成分により過敏症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。 (2)ぜんそくを起こしたことがある人。 (3)15歳未満の小児。</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください (1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹、かぶれ、傷口。 (3)みずむし・たむし等または化膿している患部。</p> <p>【相談すること】</p> <p>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p> <p>〔関係部位〕 〔症 状〕 皮膚 : 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感</p> <p>3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又登録販売者に相談してください</p>
6	薬剤師が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。