

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ノスボールエック「小児用」
2	成分・分量	24mL中 アセトアミノフェン 300mg、リン酸ジヒドロコデイン 8mg dl-塩酸メチルエフェドリン 20mg、カンゾウエキス(原生薬換算量 1664mg) 416mg、マレイン酸クロルフェニラミン 2.5mg、無水カフェイン 25mg ニンジンエキス(原生薬換算量 201mg) 30mg
3	用法・用量	次の1回量を1日3回食後なるべく30分以内及び必要な場合には就寝前に服用して下さい。また、場合により1日6回まで服用できますが、このような場合には約4時間の間隔をおいて下さい。なお服用の際は添付の計量カップではかって服用して下さい 3歳以上7歳未満 4mL、1歳以上3歳未満 3mL、6ヶ月以上1歳未満 2.4mL 3ヶ月以上6ヶ月未満 2mL、
4	効能・効果	かぜの諸症状(発熱、せき、たん、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、頭痛、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は服用しないで下さい (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい 4. 服用時は飲酒しないで下さい 5. 長期連用しないで下さい 次に該当する人はお申し出下さい <ul style="list-style-type: none"> ・医師又は歯科医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・授乳中の高齢者 ・本人又は家族がアレルギー体质の人 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・高熱、むくみ、排尿困難の症状のある人 ・甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障の診断を受けた人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。