

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ベルサダンエース錠
2	成分・分量	1日量(9錠)中 イブuproフェン 450mg、リン酸ジヒドロコデイン 24mg、マレイン酸クロルフェニラミン 7.5mg、dl-塩酸メチルエフェドリン 60mg、無水カフェイン 75mg、リボフラビン 12mg、
3	用法・用量	次の量を食後なるべく30分以内に服用して下さい。 成人(15歳以上)1回3錠、1日3回
4	効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないで下さい</p> <p>(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人</p> <p>(3)15歳未満の小児</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい</p> <p>他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去たん薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい</p> <p>4. 服用時は飲酒しないで下さい</p> <p>5. 5日間を超えて服用しないで下さい</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師又は歯科医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・授乳中の人 ・高齢者 ・本人又は家族がアレルギー体質の人 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人・高熱、排尿困難の症状のある人 ・高血圧、心臓病、糖尿病、緑内障、肝臓病、腎臓病、甲状腺機能障害、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病の診断を受けた人 ・胃、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病にかかったことのある人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。