

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	スルーロンせきどめ液
2	成分・分量	1日量(60mL)中 dl-塩酸メチルエフェドリン ・・75mg、 リン酸ジヒドロコデイン ・・30mg、マレイン酸クロルフェニラミン ・・12mg グアヤコールスルホン酸カリウム ・・270mg ナンテンジツ流エキス(原生薬換算量 2000mg) ・・2000mg バクモンドウ流エキス(原生薬換算量 1100mg) ・・1100mg キキョウ流エキス(原生薬換算量 600mg) ・・600mg
3	用法・用量	次の1回量を1日3回食後及び必要な場合には就寝前にまた、場合により約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用できます 成人(15歳以上) 10mL、11歳以上15歳未満 6. 5mL、 8歳以上11歳未満 5mL、5歳以上8歳未満 3. 3mL、 3歳以上5歳未満 2. 5mL、1歳以上3歳未満 2mL
4	効能・効果	せき、たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい 3. 過料服用・長期連用しないで下さい 次に該当する人はお申し出下さい ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・授乳中の人 ・高齢者 ・本人又は家族がアレルギー体質の人 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・高熱症状のある人 ・心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害の診断を受けた人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。