

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ダイヤルかぜ3顆粒
2	成分・分量	3包(6g) (1日量)中 アセトアミノフェン 900mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg、柴胡桂枝湯乾燥エキス 1000mg
3	用法・用量	成人(15才以上):1回1包、1日3回;11才以上15才未満:1回2/3包、1日3回; 7才以上11才未満:1回1/2包、1日3回;3才以上7才未満:1回1/3包、1日3回; 1才以上3才未満:1回1/4包、1日3回;1才未満:服用しないこと 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。 食後なるべく30分以内に水又はお湯にて服用してください。
4	効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。) 4. 服用前後は飲酒しないでください 5. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください ・医師又は歯科医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・授乳中の人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人。 高熱、排尿困難 ・次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障 [小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。]
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。