

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	フレンドール
2	成分・分量	1 カプセル中 トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) 100mg
3	用法・用量	成人(15 歳以上)は、1回1カプセルを1日1～3回服用する。ただし1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩服用する。
4	効能・効果	○ 末梢血行障害による次の諸症状の緩和:肩・首すじのこり、手足のしびれ、冷え、しもやけ。 ○ 更年期における次の諸症状の緩和:肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ。 ○ 月経不順「ただし、これらの症状について、1 カ月ほど服用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること」 ○ 次の場合のビタミンEの補給:老年期
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 (1)医師の治療を受けている人。 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 〔関係部位〕皮膚 〔症状〕発疹・発赤、かゆみ 〔関係部位〕消化器〔症状〕胃部不快感 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 便秘、下痢 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 5. 服用後、生理が予定より早きたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。 出血が長く続く場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
6	薬剤師(又は登録販売者)が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。