

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	リナ α クリーム
2	成分・分量	(1g中) プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル:1.5mg・クロタミトン:50mg・トコフェロール酢酸エステル:5mg・イソプロピルメチルフェノール:1mg
3	用法・用量	1日数回、適量を患部に塗擦してください。
4	効能・効果	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の部位には使用しないでください。(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部(2)目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等 2. 顔面には広範囲に使用しないでください。3. 長期連用しないで下さい。 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)患部が広範囲の人。(5)湿潤やただれのひどい人。 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 〔関係部位〕皮膚〔症 状〕発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感、 〔関係部位〕皮膚(患部)〔症 状〕みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感 3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
6	薬剤師(又は登録販売者)が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。