

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	イソロ錠
2	成分・分量	6錠中 胆汁末：130mg、センブリ末：15mg、デヒドロコール酸：60mg
3	用法・用量	1日3回食後服用してください。15歳以上：6錠、11歳以上15才未満：4錠、8歳以上11歳未満：3錠、5歳以上8歳未満：2錠、5歳未満：服用しないこと
4	効能・効果	食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化促進、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。 （1）医師の治療を受けている人。 （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。 2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文章を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
6	薬剤師(又は登録販売者)が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。