

# 説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	「小児用」感冒薬リココデS液
2	成分・分量	1本(30mL)中に次の成分を含んでいます。 アセトアミノフェン314mg・ジヒドロコデインリン酸塩10mg・dl-メチルエフェドリン塩酸塩21mg・クロルフェニラミンマレイン酸塩4mg・カフェイン水和物40mg・リボフラビンリン酸エステルナトリウム1.5mg
3	用法・用量	1回 3歳以上7歳未満:2.5mL・1歳以上3歳未満:1.8mL・6カ月以上1才未満:1.5mL、1日3回食後および必要な場合には就寝前に服用するものとし、また、場合によっては、1日6回まで服用することとしても差し支えないが、1日6回服用する場合には原則として約4時間の間隔を置いて服用して下さい。(計量容器を添付する)・6カ月未満の乳児は服用しないこと (2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい)
4	効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。 1. 次の人は服用しないで下さい。(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬) 3. 用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。眠気があらわれることがあります。 4. 用時は飲酒しないで下さい。5. 長期連用しないで下さい。 6. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。 ○. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)授乳中の人。(4)高齢者。(5)本人又は家族がアレルギー体質の人。(6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(7)次の症状のある人。 高熱、排尿困難。(8)次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師(又は登録販売者)が必要と判断する事項	

【注意事項】

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。