

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	鎮咳去痰剤 新リココデ錠
2	成分・分量	9錠中に次の成分を含んでいます ジヒドロコデインリン酸塩30mg・d1-メチルエフェドリン塩酸塩50mg ・ジプロフィリン100mg・グアヤコールスルホン酸カリウム270mg・ クロルフェニラミンマレイン酸塩12mg・キキョウ末300mg・ケイヒ末1 50mg
3	用法・用量	大人（15歳以上）1回3錠、12歳以上15歳未満 1回2錠 1日3回な るべく空腹時を避けて服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。 *（1）用法・用量を厳守すること。（2）小児に服用させる場合には、保護者 の指導監督のもとに服用させること。（3）12歳未満の小児は服用しな いこと。
4	効能・効果	せき・たん
5	保健衛生上の 危害を防止する ために必要な事 項	（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。） 1．本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用 内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）2．服用後、乗物等の運転をしないで 下さい。（眠気があらわれることがあります。）3．授乳中の方は本剤を服用し ないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。4．過量服用・長期連用し ないで下さい。 2．次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 （1）医師の治療を受けている人。（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。 （3）高齢者。（4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 （5）次の症状のある人。高熱、排尿困難（6）次の診断を受けた人。心臓病、 高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん、呼吸機能障害、閉塞性睡 眠時無呼吸症候群、肥満症
6	薬剤師（又は登 録販売者）が必 要と判断する事 項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。