

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	リコデせき止め液Z
2	成分・分量	60mL（成人1日量）中に次の成分を含んでいます。 ジヒドロコデインリン酸塩：30mg、d1-メチルエフェドリン塩酸塩：45mg、ジプロピリン120mg、グアヤコールスルホン酸カリウム270mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩：12mg、キキョウ流エキス：0.6mL
3	用法・用量	下記の量を1日3回毎食後に服用する。また場合により1日6回まで服用しても差し支えないが、この場合は服用間隔を4時間以上おくこと。（計量容器を添付する） 1回量成人（15歳以上）：10mL、11歳以上15歳未満：6.5mL、8歳以上11歳未満：5.0mL、5歳以上8歳未満：3.0mL、3歳以上5歳未満：2.5mL、1歳以上3歳未満：2.0mL （用法・用量に関連する注意）（1）用法・用量を厳守して下さい。（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。（3）2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。（4）1歳未満の乳児には服用させないで下さい。（5）本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用して下さい。
4	効能・効果	せき、たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。） 1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）2. 服用後、乗物等の運転をしないで下さい。（眠気があらわれることがあります。）3. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。4. 過量服用・長期連用をしないで下さい 2. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 （1）医師の治療を受けている人。（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。（3）高齢者。（4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。（5）次の症状のある人。高熱、排尿困難（6）次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん
6	薬剤師（又は登録販売者）が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。