医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名称	セキセチン SP 錠
2	成分･分量	【6錠中】 L-エチルシステイン塩酸　300mg　　グアイフェネシ　300mg dℓ－メチルエフェドリン塩酸　75mg　　チペピジンヒベンズ酸　75mg セネガ乾燥エキス　120mg　(セネガとして 2,000mg) キキョウ乾燥エキス　200mg　(キキョウとして 900mg)
3	用法･用量	1日3回、1回下記量を食後に水又はお湯と一緒に服用してください。 成人 (15 歳以上)　　2錠 8 歳以上 15 歳未満　　1錠 8 歳未満服用させないでください
4	効能･効果	たん、せき
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等 (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 次に該当する人はお申し出ください。 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人　(4) 高齢者 (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6) 次の症状のある人　高熱 (7) 次の診断を受けた人　心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】 【本剤は、内核が腸溶性の有核錠ですので、かんだり、つぶしたりせずにそのまま服用してください。また、制酸剤又は牛乳と同時に服用しないでください。】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

(注意事項)

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入･選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。