医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名称	ワクナガ　フジコールW
2	成分･分量	3包中　(5，400mg) アセトアミノフェン･･･500mg、　クロルフェニラミンマレイン酸塩･･･7．5mg チペピジンヒベンズ酸塩･･･75mg、 グアヤコールスルホン酸カリウム･･･150mg 無水カフェイン･･･90mg、　葛根湯乾燥エキス･･･1，500mg
3	用法･用量	1回下記量を毎食後なるべく30分以内に、水又はお湯と一緒に服用してください。 〔年　齢〕　〔1回量〕　〔1日服用回数〕 大人（15才以上）　1包　3回 11才以上15才未満　2／3包　3回 7才以上11才未満　1／2包　3回 3才以上7才未満　1／3包　3回 1才以上3才未満　1／4包　3回 1才未満　服用させないでください
4	効能･効果	かぜの諸症状（悪寒、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	【してはいけないこと】 1．次の人は服用しないでください。 （1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 （2）本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 2．本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用　内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等） 3．服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気等があらわれることがあります。）4．服用前後は飲酒しないでください。　5．長期連用しないでください。 【相談すること】　次に該当する人はお申し出ください。 ･医師又は歯科医師の治療を受けている人　･妊婦又は妊娠していると思われる人 ･高齢者　･薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人･高熱、排尿困難の症状のある人　･甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃･十二指腸潰瘍、緑内障の診断を受けた人 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】 【2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1．本紙の内容は、お客様が医薬品を購入･選択時に、役立たせるために必要な情報です。

2．情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。

3．使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。