

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ウオノメバンF フリーサイズ
2	成分・分量	膏体100g(1000cm <sup>2</sup> )中、サリチル酸50gを含む。添加物として精製ラノリン、ロジンエステルその他2成分を含む。
3	用法・用量	<p>●1日毎に交換してください。特にご入浴後の使用は効果的です。</p> <p>●交換の際には白くなった角質部を消毒したピンセットなどで取り除き、完全に取りきるまで本品の使用を繰り返してください。特にうおの目は、まん中の堅くなった角質の「しん」を完全に取り除かないと再発します。</p> <p>●ズレやすいところは、固定用絆創膏でさらにしっかり固定してください。</p> <p>(1) 小児に使用させる場合は、保護者の監督のもとに使用させてください。</p> <p>(2) 万一目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。</p> <p>(3) 外用のみに使用してください。</p>
4	効能・効果	うおの目、たこ、いぼ
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p><b>次の部位には使用しないでください</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>目の周囲、粘膜、やわらかい皮膚の面(首の周り等)、顔面等</li> <li>炎症又は傷、化膿のある患部等</li> <li>群生したいぼ、体に多発したいぼ、みずいぼ、湿ったいぼ</li> <li>外陰部や肛門周囲にできたぶよぶよしたいぼ</li> <li>褐色か淡黒色の扁平に隆起した老人性いぼ</li> <li>かきキズにそって一列にできた若年性扁平いぼ</li> </ol> <p><b>相談すること</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>乳幼児に使用する場合</li> <li>本人または家族がアレルギー体質の人</li> <li>薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人</li> <li>化粧品等によるアレルギー症状(たとえば発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人</li> <li>妊婦又は妊娠していると思われる人(サリチル酸の内服による動物実験で、胎児の奇形を起こす作用が報告されています)</li> <li>糖尿病の治療を受けている人(糖尿病患者は感染抵抗力が低下していません。角質を取る際に皮ふを傷つけてしまった場合、感染しやすくなります)</li> </ol>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。