

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	小児用カゼヒスミン
2	成分・分量	1日量(3包)中 アセトアミノフェン 450mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.75mg、チペピジン ヒベンズ酸塩 30mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg、リボフラビン 3mg、 カンゾウエキス末 36mg
3	用法・用量	次の量を1日3回食後なるべく30分以内に服用して下さい。 〔年齢〕 〔1回服用量〕 7才以上11才未満 : 1包 3才以上7才未満 : 2/3包 1才以上3才未満 : 1/2包 1才未満 : 服用しないこと
4	効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、 頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないで下さい (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬 (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい (眠気があらわれることがあります) 4. 服用時は飲酒しないで下さい 5. 長期連用しないで下さい  次に該当する人はお申し出下さい (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる 人(3)授乳中の人(4)高齢者(5)本人又は家族がアレルギー体質の人(6)薬により アレルギー症状を起こしたことがある人(7)次の症状のある人:高熱、排尿困難(8) 次の診断を受けた人:甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、 胃・十二指腸潰瘍、緑内障  【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい】
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の  
薬剤師または登録販売者にご相談下さい。