

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	コンチーム錠
2	成分・分量	成人1日量(18錠)中 乾燥酵母(ビール酵母)2070mg / コンチーム(麦芽末, 納豆菌, 麹菌等)990mg / ジアスターゼ 360mg / ラクトミン(乳酸菌末)36mg / リン酸水素カルシウム 水和物 630mg / チアミン塩化物塩酸塩 9mg / リボフラビン 3.6mg
3	用法・用量	次の1回量を1日3回毎食後に服用してください。 成人(15才以上):1回6錠 / 11才以上15才未満:1回4錠 / 8才以上11才未満:1回3錠 / 5才以上8才未満:1回2錠 / 5才未満:服用しないこと
4	効能・効果	消化促進, 消化不良, 食欲不振(食欲減退), 食べ過ぎ(過食), もたれ(胃もたれ), 胸つかえ, 消化不良による胃部・腹部膨満感, 整腸(便通を整える), 腹部膨満感, 軟便, 便秘
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	次に該当する方はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人 (2)本人又は家族がアレルギー体質の人 (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。