

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	セダックス錠
2	成分・分量	1回量(2錠)中 イブプロフェン 150mg アシルイソプロピルアセチル尿素 60mg 無水カフェイン 80mg
3	用法・用量	1回量を1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用して下さい。 服用間隔は4時間以上おいて下さい。 大人(15才以上) 1回2錠 15才未満 服用しないこと
4	効能・効果	○頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・生理痛・外傷痛の鎮痛 ○悪寒・発熱時の解熱
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は、服用しないこと (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 (3)15才未満の小児。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気があらわれることがある。) 4. 服用時は飲酒しないこと 5. 長期連用しないこと 次に該当する人はお申し出下さい ・ 医師又は歯科医師の治療を受けている人。 ・ 妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・ 授乳中の人。 ・ 高齢者。 ・ 本人又は家族がアレルギー体質の人。 ・ 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・ 次の診断を受けた人。 心臓病、腎臓病、肝臓病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病 ・ 次の病気にかかったことのある人。 胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。