

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	こどもレジャー液
2	成分・分量	1回量（1ビン 10mL）中 スコポラミン臭化水素酸塩水和物 0.125mg 無水カフェイン 25mg ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B6） 10mg
3	用法・用量	乗物酔いの予防には、乗車船 30 分から 1 時間前に次の 1 回量を服用すること。 7 才以上 15 才未満 1 回1ビン 4 時間以上の間隔をおいて1日 2 回まで 7 才未満 服用しないこと
4	効能・効果	乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬）</p> <p>2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと （眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。）</p> <p>次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師の治療を受けている人。 ・ 妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・ 高齢者。 ・ 本人又は家族がアレルギー体質の人。 ・ 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・ 次の症状のある人。 排尿困難 ・ 次の診断を受けた人。 緑内障、心臓病
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師
または登録販売者にご相談下さい。