

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アスゲン鼻炎カプセル S
2	成分・分量	[4カプセル(成人1日服用量)中] クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg、塩酸プソイドエフェドリン 120mg、 ベラドンナ総アルカロイド 0.4mg、グリチルリチン酸 45mg、無水カフェイン 100mg
3	用法・用量	下記の1回量を1日2回朝夕に服用してください。 成人(15歳以上):2カプセル、7歳以上15歳未満:1カプセル、 7歳未満:服用しないこと
4	効能・効果	急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和: くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください。</p> <p>(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2)次の症状がある人:前立腺肥大による排尿困難</p> <p>(3)次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。</p> <p>他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)</p> <p>4. 長期連用しないでください。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・授乳中の人。</li> <li>・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>・かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。</li> <li>・次の症状のある人:高熱、排尿困難、むくみ ・次の診断を受けた人:緑内障、腎臓病</li> <li>・モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)で治療を受けている人。</li> </ul> <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください】</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。