

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)														
2	成分・分量	[本品 1 包(1 日量)18.5g 中] 日本薬局方 ポウイ 5.0g 日本薬局方 オウギ 5.0g 日本薬局方 ビャクジュツ 3.0g 日本薬局方 タイソウ 3.0g 日本薬局方 カンゾウ 1.5g 日本薬局方 ショウキョウ 1.0g														
3	用法・用量	大人(15 才以上)は 1 包(1 日量)につき水 400mL を加えあまり強くない火にかけ 200mL に煮つめ、紙袋とともに煎じかすを取り去り、3~2 回に分けて食前 1 時間前又は食間空腹時に温服してください。 小人(15 才未満 4 才以上)は下記の量を 1 日 3 回に分けて服用してください。 <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1 包(1 日量)煎じ液</th><th>1 日服用量</th></tr></thead><tbody><tr><td>大人(15 才以上)</td><td>全量</td><td>3~2 回に分けて</td></tr><tr><td>15 才未満 7 才以上</td><td>2/3 量</td><td rowspan="2">3 回に分けて</td></tr><tr><td>7 才未満 4 才以上</td><td>1/2 量</td></tr><tr><td>4 才未満</td><td colspan="2">服用しないこと</td></tr></tbody></table>	年齢	1 包(1 日量)煎じ液	1 日服用量	大人(15 才以上)	全量	3~2 回に分けて	15 才未満 7 才以上	2/3 量	3 回に分けて	7 才未満 4 才以上	1/2 量	4 才未満	服用しないこと	
年齢	1 包(1 日量)煎じ液	1 日服用量														
大人(15 才以上)	全量	3~2 回に分けて														
15 才未満 7 才以上	2/3 量	3 回に分けて														
7 才未満 4 才以上	1/2 量															
4 才未満	服用しないこと															
4	効能・効果	色白で疲れやすく、汗のかきやすい傾向のある次の諸症:肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)、関節痛、むくみ														
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出ください。 (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者。 (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 (5)次の症状のある人。:むくみ (6)次の診断を受けた人。:高血圧、心臓病、腎臓病														
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項															

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。