

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ボランテチックPX
2	成分・分量	[100g 中] ピロキシカム…0.5g、l-メントール…3.0g
3	用法・用量	・1日3～4回適量を患部に塗擦してください。 (キャップをとり、容器底部を回し、薬剤を3～4mm出して使用してください。) ・15歳未満の小児は使用しないでください。
4	効能・効果	肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、打撲、捻挫
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)ぜんそくを起こしたことがある人。 (3)妊婦または妊娠していると思われる人。 (4)15歳未満の小児。 2. 次の部位には使用しないでください (1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹、かぶれ、傷口。 (3)みずむし・たむし等または化膿している患部。 3. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人。 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。