

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	チルコール溶かして飲むかぜ薬
2	成分・分量	[3包(成人1日服用量)中] アセトアミノフェン 900mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、ジヒドロコ デインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、アスコルビン酸(ビタ ミンC) 500mg、カンゾウ乾燥エキス 70mg(原生薬として500mg)、ショウキョウ 乾燥エキス 50mg(原生薬として300mg)
3	用法・用量	次の量を1日3回、約100mLのお湯又は水に溶かして、食後なるべく30分以内に 服用してください。成人(15才以上):1包 15才未満:服用しないこと
4	効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒(発熱による 寒気)、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用しないでください。 (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服 薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれるこ とがある) 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてくださ い。 服用前後は飲酒しないでください。 長期連用しないでください。 <p>次に該当する人はお申し出ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師又は歯科医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の症状のある人:高熱、排尿困難 ・次の診断を受けた人: 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・ 十二指腸潰瘍、緑内障
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師
または登録販売者にご相談下さい。