

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	レーバンH坐剤EX
2	成分・分量	<p>[1個(1.5g)中]</p> <p>ヒドロコルチゾン酢酸エステル … 5mg</p> <p>リドカイン … 60mg</p> <p>酸化亜鉛 … 80mg</p> <p>イソプロピルメチルフェノール … 2mg</p> <p>クロルフェニラミンマレイン酸塩 … 4mg</p> <p>アラントイン … 20mg</p> <p>グリチルレチン酸 … 6mg</p> <p>トコフェロール酢酸エステル … 60mg</p>
3	用法・用量	成人(15歳以上)1回1個を1日1~3回、肛門内に挿入してください。
4	効能・効果	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください。</p> <p>(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2)患部が化膿している人。</p> <p>2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。</p> <p>抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</p> <p>3. 使用后、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。</p> <p>(眠気等があらわれることがあります。)</p> <p>4. 長期連用しないでください。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください。</p> <p>(1)医師の治療を受けている人。</p> <p>(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。</p> <p>(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(4)次の症状のある人。 排尿困難</p> <p>(5)次の診断を受けた人。 緑内障</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。