

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	カイベールC
2	成分・分量	1錠中 ビサコジル5mg センノサイド20mg
3	用法・用量	15才以上の方は下記の用量を1日1回就寝前(又は空腹時)に服用してください。 ・2～3日便通がない時1～2錠 ・4日以上便通がない時2～3錠 ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。 15才未満の小児は服用しないでください。
4	効能・効果	○便秘 ○便秘に伴う次の症状の緩和:肌あれ、吹出物、頭重、のぼせ、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常發酵、痔
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の瀉下薬(下剤) 2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 3. 大量に服用しないでください 次の人はご相談ください (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4)次の症状のある人。 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。