

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	宇津ジュニアかぜ薬A
2	成分・分量	1日量(12錠)中 アセトアミノフェン600mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩2.33mg、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物32mg、dlメチルエフェドリン塩酸塩20mg、グアヤコールスルホン酸カリウム100mg、無水カフェイン100mg、カンゾウ粗エキス106.6mg(原生薬換算533mg)、キキョウエキス53.3mg(原生薬換算533mg)
3	用法・用量	次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。 [年齢] [1回服用量] [1日服用回数] 5才以上 7才未満 2錠 3回 7才以上11才未満 3錠 3回 11才以上15才未満 4錠 3回 5才未満 服用させないこと
4	効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛剤を服用してぜんそくを起したことがある人。2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。他のかぜ薬、解熱鎮痛剤、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗り物酔い薬、アレルギー用薬)3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。眠気が現れることがあります。4. 服用時は飲酒しないでください。5. 長期連用はしないでください。 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。 (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)授乳中の人(4)高齢者(5)本人又は家族の人がアレルギー体質の人(6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人(7)次の症状がある人 高熱、排尿困難(8)次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。