

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	キオリトル
2	成分・分量	1個(950mg)中 アセトアミノフェン 100mg
3	用法・用量	次の量を、肛門内に挿入して下さい。 [年齢] [1回服用量] [1日服用回数] 1才～2才 1/2～1個 1回 3才～5才 1個 1回 6才～12才 1～2個 1回 1才未満 使用させないこと
4	効能・効果	小児の発熱時の一時的な解熱
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないでください。 (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他の解熱鎮痛剤、かぜ薬を使用してぜんそくを起したことがある人。 2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。 他のかぜ薬、解熱鎮痛剤、鎮静薬。 3. 使用時は飲酒しないでください。 4. 連用しないでください。 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。 (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)本人又は家族の人がアレルギー体質の人 (4)高齢者及び虚弱者 (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6)次の診断を受けた人 心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。