

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	トラベルミンR
2	成分・分量	1回量(11才以上)1錠中 ジフェニドール塩酸塩 16.6mg、スコポラミン臭化水素酸塩水和物 0.16mg、 無水カフェイン 30.0mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆) 5.0mg <small>※添加物は外箱、添付文書を参照</small>
3	用法・用量	乗物酔いの予防には、乗車船30分前に、次の1回量を水またはお湯で服用してください。 成人(15才以上)及び11才~14才 1回1錠 なお、追加服用する場合は、1回量を4時間以上の間隔をおいて服用してください。 1日の服用回数は2回までとしてください。 11才未満は服用しないでください。 <small>[用法・用量に関する注意]</small> 小児(11才~14才)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。修学旅行などに持たせる場合には、事前に用法、用量など、服用方法をよく指導してください。
4	効能・効果	乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等) 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください <small>(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)</small> 【次に該当する人はお申し出ください】 ●医師の治療を受けている人 ●妊婦又は妊娠していると思われる人 ●高齢者 ●薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ●次の症状のある人 排尿困難 ●次の診断を受けた人 緑内障、心臓病
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。