

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ロコフィットGL																		
2	成分・分量	<p>12錠（1日量）中</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防已黄耆湯エキス</td> <td>1,600 mg</td> </tr> <tr> <td>（下記生薬のエキス</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ポウイ</td> <td>2,508 mg</td> </tr> <tr> <td>    オウギ</td> <td>2,508 mg</td> </tr> <tr> <td>    ソウジュツ</td> <td>1,505 mg</td> </tr> <tr> <td>    タイソウ</td> <td>1,505 mg</td> </tr> <tr> <td>    カンゾウ</td> <td>752 mg</td> </tr> <tr> <td>    ショウキョウ</td> <td>502 mg</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	防已黄耆湯エキス	1,600 mg	（下記生薬のエキス		ポウイ	2,508 mg	オウギ	2,508 mg	ソウジュツ	1,505 mg	タイソウ	1,505 mg	カンゾウ	752 mg	ショウキョウ	502 mg
成分	分量																			
防已黄耆湯エキス	1,600 mg																			
（下記生薬のエキス																				
ポウイ	2,508 mg																			
オウギ	2,508 mg																			
ソウジュツ	1,505 mg																			
タイソウ	1,505 mg																			
カンゾウ	752 mg																			
ショウキョウ	502 mg																			
3	用法・用量	<p>次の量を食前、食間（就寝前を含む）又は空腹時に白湯又は水で服用してください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人（15歳以上）</td> <td>4錠</td> <td>3回</td> </tr> <tr> <td>15歳未満</td> <td colspan="2">服用しないこと</td> </tr> </tbody> </table> <p>※食間とは食後2～3時間のことをいいます。</p>	年齢	1回量	1日服用回数	成人（15歳以上）	4錠	3回	15歳未満	服用しないこと										
年齢	1回量	1日服用回数																		
成人（15歳以上）	4錠	3回																		
15歳未満	服用しないこと																			
4	効能・効果	<p>体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症： 肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）</p>																		
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師の治療を受けている人。</li> <li>・妊婦又は妊娠していると思われる人。</li> <li>・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。</li> </ul>																		
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項																			

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。