

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	プレミナスIP									
2	成分・分量	2錠中 イブプロフェン 150 mg アリルイソプロピルアセチル尿素 60mg 無水カフェイン 80mg									
3	用法・用量	次の量をなるべく空腹時をさけて服用してください。 服用間隔は、4時間以上おいてください。 <table border="1"><thead><tr><th>年齢</th><th>1回量</th><th>服用回数</th></tr></thead><tbody><tr><td>成人(15才以上)</td><td>2錠</td><td>1日3回</td></tr><tr><td>15才未満</td><td colspan="2">服用しないこと</td></tr></tbody></table>	年齢	1回量	服用回数	成人(15才以上)	2錠	1日3回	15才未満	服用しないこと	
年齢	1回量	服用回数									
成人(15才以上)	2錠	1日3回									
15才未満	服用しないこと										
4	効能・効果	○頭痛・歯痛・生理痛・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・肩こり痛・ 抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛 ○悪寒・発熱時の解熱									
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は服用しないでください (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 (3) 15才未満の小児。 (4) <u>出産予定日12週以内の妊婦。</u> 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります) 4. 服用前後は飲酒しないでください 5. <u>長期連続して服用しないでください</u> 次に該当する人はお申し出ください (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 授乳中の人。 (4) 高齢者。 (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (6) 次の診断を受けた人。 心臓病、腎臓病、肝臓病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病 (7) 次の病気にかかったことのある人。 胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病									

6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	
---	-----------------------	--

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。