

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	キャベジンコーワ細粒													
2	成分・分量	3 包:3.9g中 メチルメチオニンスルホニウムクロリド 150mg、水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈物 1370mg、酸化マグネシウム 330mg、ロートエキス3倍散 90mg(ロートエキスとして 30mg)、ウイキョウ末 300mg、ショウキョウ末 100mg、チョウジ末 50mg、ビオチンアスターゼ 2000 30mg													
3	用法・用量	<p>下記の量を毎食後水又は温湯で服用してください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人(15歳以上)</td> <td>1包</td> <td rowspan="3">3回</td> </tr> <tr> <td>11歳以上15歳未満</td> <td>2/3包</td> </tr> <tr> <td>8歳以上11歳未満</td> <td>1/2包</td> </tr> <tr> <td>8歳未満の小児</td> <td colspan="2">服用しないこと</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人(15歳以上)	1包	3回	11歳以上15歳未満	2/3包	8歳以上11歳未満	1/2包	8歳未満の小児	服用しないこと	
年齢	1回量	1日服用回数													
成人(15歳以上)	1包	3回													
11歳以上15歳未満	2/3包														
8歳以上11歳未満	1/2包														
8歳未満の小児	服用しないこと														
4	効能・効果	胃酸過多、胸やけ、げっぷ、胸つかえ、胃部不快感、胃重、胃痛、胃部・腹部膨満感、もたれ、嘔吐、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、飲みすぎ、食べ過ぎ、食欲不振、胃弱、消化不良、消化促進													
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください 透析療法を受けている人。</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 胃腸鎮痛鎮痙薬</p> <p>3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</p> <p>4. 長期連用しないでください。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師の治療を受けている人。</li> <li>・妊婦又は妊娠していると思われる人。</li> <li>・高齢者。</li> <li>・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>・次の症状のある人。 排尿困難</li> <li>・次の診断を受けた人。 腎臓病、心臓病、緑内障</li> </ul>													
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項														

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。