

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	コルゲンコーワ鼻炎ジェット									
2	成分・分量	1mL 中 ナファゾリン塩酸塩 0.5mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 5.0mg、ベンザルコニウム塩化物 0.2mg、リドカイン 3.0mg									
3	用法・用量	下記の量を鼻腔内に噴霧してください。なお、適用間隔は3時間以上おいてください。									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>1日使用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人(15歳以上)及び7歳以上の小児</td> <td>1～2度ずつ</td> <td>1～5回</td> </tr> <tr> <td>7歳未満の幼児</td> <td colspan="2">使用しないこと</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	1回量	1日使用回数	成人(15歳以上)及び7歳以上の小児	1～2度ずつ	1～5回	7歳未満の幼児	使用しないこと	
		年齢	1回量	1日使用回数							
成人(15歳以上)及び7歳以上の小児	1～2度ずつ	1～5回									
7歳未満の幼児	使用しないこと										
4	効能・効果	アレルギー性鼻炎、急性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重(頭が重い)									
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>2. 長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師の治療を受けている人。</li> <li>・妊婦又は妊娠していると思われる人。</li> <li>・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>・次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障</li> </ul> <p>【小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。】</p>									
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項										

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。