

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	コルゲンコーワ IB 錠									
2	成分・分量	9 錠中 イブプロフェン 450mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、グアイフェネシン 250mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 40mg									
3	用法・用量	<p>下記の量を食後なるべく 30 分以内に水又は温湯で服用してください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1 回量</th> <th>1 日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人(15 歳以上)</td> <td>3 錠</td> <td>3 回</td> </tr> <tr> <td>15 歳未満の小児</td> <td colspan="2">服用しないこと</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	1 回量	1 日服用回数	成人(15 歳以上)	3 錠	3 回	15 歳未満の小児	服用しないこと	
年齢	1 回量	1 日服用回数									
成人(15 歳以上)	3 錠	3 回									
15 歳未満の小児	服用しないこと										
4	効能・効果	かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、悪寒、頭痛、せき、たん、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和									
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください</p> <p>(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。</p> <p>(3)15 歳未満の小児。</p> <p>(4)出産予定日 12 週以内の妊婦。</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください</p> <p>他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください</p> <p>4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</p> <p>5. 服用前後は飲酒しないでください</p> <p>6. 5 日間を超えて服用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師又は歯科医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人。 高熱、排尿困難 ・次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 ・次の病気にかかったことのある人。 胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病 									
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項										

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。