

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	バンテリンコーワゲル LT
2	成分・分量	1g 中 インドメタシン 10mg、l-メントール 30mg
3	用法・用量	1日4回を限度として適量を患部に塗擦してください。
4	効能・効果	筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2) ぜんそくを起こしたことがある人。</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。 (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。</p> <p>3. 長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・本人又は家族がアレルギー体質の人 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。