

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず缶の説明書を読んで下さい

1	名称	バンテリンコーワエアロゲル
2	成分・分量	90mL 中 インドメタシン 0.481g、トメントール 1.443g (ただし、原液 1g 中 インドメタシン 10mg、トメントール 30mg)
3	用法・用量	1 日 4 回を限度として適量を患部に噴射塗布する、又は手に取って患部に塗布する。
4	効能・効果	筋肉痛、打撲、捻挫、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、肩こりに伴う肩の痛み
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2) ぜんそくを起こしたことがある人。 2. 次の部位には使用しないでください (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。 (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。 3. 顔に向けて噴射しないでください 4. 長期連用しないでください  次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。 ・妊娠又は妊娠していると思われる人。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。