

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	コルゲンコーカ IB 錠 TX											
2	成分・分量	9錠中 イブプロフェン 450mg、トラネキサム酸 750mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、グアイフェネシン 250mg、無水カフェイン 75mg											
3	用法・用量	下記の量を食後なるべく30分以内に水又は温湯で服用してください。 <table border="1"> <tr> <td>年齢</td> <td>1回量</td> <td>1日服用回数</td> </tr> <tr> <td>成人(15歳以上)</td> <td>3錠</td> <td>3回</td> </tr> <tr> <td>15歳未満の小児</td> <td colspan="2">服用しないこと</td></tr> </table>			年齢	1回量	1日服用回数	成人(15歳以上)	3錠	3回	15歳未満の小児	服用しないこと	
年齢	1回量	1日服用回数											
成人(15歳以上)	3錠	3回											
15歳未満の小児	服用しないこと												
4	効能・効果	かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、悪寒、頭痛、せき、たん、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和											
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 (3)15歳未満の小児。 (4)出産予定日12週以内の妊婦。</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、トラネキサム酸を含有する内服薬</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください</p> <p>4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</p> <p>5. 服用前後は飲酒しないでください</p> <p>6. 5日間を超えて服用しないでください。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師又は歯科医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人。高熱、排尿困難 ・次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎)、血栓症を起こすおそれのある人、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 ・次の病気にかかったことのある人。胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病 											
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項												

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。